

En suivant le vallon, on trouve, sur les murs du Moulin Guche, l'*Hypnum rusciforme* et le *Barbula ambigua*. Près d'une grande écluse située un peu plus en aval on fait une récolte abondante :

<i>Hypnum tenellum</i> .	<i>Grimmia pulvinata</i> .
— <i>alopecurum</i> .	— <i>apocarpa</i> .
<i>Homalia trichomanoides</i> .	<i>Fegatella conica</i> .
<i>Neckera complanata</i> .	<i>Lunularia vulgaris</i> .
<i>Barbula laevipila</i> .	<i>Aneura pinguis</i> .
— <i>revoluta</i> .	

L'*Hypnum tenellum* n'avait encore été signalé qu'une fois dans le Pas-de-Calais. Le *Lunularia vulgaris* est nouveau pour le département.

Aux environs de l'écluse les troncs d'arbres présentent en abondance : *Leptodon Smithii*, *Leucodon sciuroides*, *Neckera complanata*, *Cryphæa arborea*, *Orthotrichum affine*, *O. diaphanum*, *Metzgeria furcata*, *Frullania dilatata*.

Les pâtures et les haies offrent des Mousses plus communes : *Hypnum purum*, *cuspidatum*, *tamariscinum*, *Stokesii*, *rutabulum*, *denticulatum*; *Atrichum undulatum*, *Weisia viridula*, *Fissidens taxifolius*, *F. bryoides*, *Mnium affine*, *Plagiochila asplenioides*.

Dans les endroits où la terre est dénudée : *Phascum cuspidatum*, *P. muticum*, *Pottia minutula*, *P. truncata*.

M. Malinvaud donne lecture des travaux suivants :

CATALOGUE DES MOUSSES RENCONTRÉES

AUX ENVIRONS D'ORLÉANS, DANS UN RAYON DE HUIT A DIX KILOMÈTRES;
par M. DU COLOMBIER.

<i>Gymnostomum microstomum Hedw.</i>	<i>Fissidens adiantoides Hedw.</i>
<i>Weisia viridula Brid.</i>	<i>Acaulon muticum Mull.</i>
— <i>mucronata B. E.</i>	<i>Phascum cuspidatum Hedw.</i>
— <i>cirrata Hedw.</i>	<i>Pottia cavifolia Ehr.</i> — Bords de la Loire, près de La Chapelle.
<i>Dicranum heteromallum Hedw.</i>	— <i>truncata B. E.</i>
— <i>scoparium Hedw.</i>	— <i>intermedia Fürn.</i>
— <i>undulatum B. E.</i> — Forêt de Chantreau.	— <i>lanceolata Mull.</i>
<i>Campylopus flexuosus Bridel.</i>	<i>Didymodon luridus Hord.</i> — Bords de la Loire, près du pont de Vierzon.
<i>Leucobryum glaucum Hampe.</i>	<i>Ceratodon purpureus Brid.</i>
<i>Fissidens exilis Hedw.</i>	<i>Pleuridium subulatum B. E.</i>
— <i>bryoides Hedw.</i>	
— <i>taxifolius Hedw.</i>	

- Trichostomum rigidulum Sm.* — RRR.
— Bords de la Loire en amont du pont de Vierzon.
- Barbula unguiculata Hedw.*
- *vinealis Brid.*
 - *revoluta Schw.*
 - *convoluta Hedw.*
 - *muralis Hedw.*
 - *subulata Hedw.* — Bois de l'Hermitage. Bois du château de la Source.
 - *papillosa Wils.* — Quai de la Madeleine.
 - *lævipila Brid.*
 - *ruralis Hedw.* — AR.
 - *intermedia Brid.* — CC.
 - *ruraliformis Besch.* — Dunes de la rive gauche de la Loire.
- Grimmia apocarpa Hedw.*
- *orbicularis B. E.*
 - *pulvinata Sm.*
 - *leucophæa Grev.* — RRR. — A Saint-Marceau.
 - *commutata Hubn.* — R. — A Fleury.
- Rhacomitrium canescens Brid.* — Dunes de la rive gauche de la Loire.
- Zygodon viridissimus Brid.* — Bois de Peupliers au bord de la Loire, à La Chapelle.
- Orthotrichum crispum Hedw.* — R. — Forêt de Chanteau.
- *Lyelli H. et Taylor.* — C.
 - *leiocarpum B. E.*
 - *affine Schr.*
 - *pumilum Swartz.*
 - *diaphanum Sckr.*
 - *anomalum Hedw.*
- Physcomitrium fasciculare B. E.* — Ça et là dans les champs.
- Funaria hygrometrica Hedw.*
- Bryum pendulum Hornsch.* — RR. — A La Foulonnerie.
- *argenteum L.*
 - *atropurpureum W. et M.*
 - *cæspititium L.*
 - *capillare L.*
 - *pseudotriquetrum Schw* — RR. — A La Foulonnerie.
 - *roseum Schreb.*
- Mnium affine Schw.* — Bois du château de la Monnaie.

- Mnium punctatum L.* — Prairies des bords du Loiret.
- Aulacomnium palustre Schw.* — Tourbières de la forêt d'Orléans.
- Bartramia fontana Brid.* — RR. — A La Foulonnerie.
- *pomiformis Hedw.*
- Atrichum undulatum P. B.*
- Polygonatum nanum P. B.*
- Polytrichum formosum Hedw.*
- *piliferum Schr.*
 - *juniperinum Hedw.* — Sologne.
- Fontinalis antipyretica L.* — Dans la Loire, à La Chapelle.
- Neckera complanata B. E.* — AR. — Forêt d'Orléans.
- Homalia trichomanoides B. E.*
- Leucodon sciuroides Schw.*
- Leskea polyantha Hedw.* — CC. — Sur les vieux ceps de Vigne.
- *sericea Hedw.*
 - — *polycarpa Ehr.* — AC. — A la base du *Populus nigra*.
- Anomodon viticulosus H. et T.*
- Cylindrothecium concinnum Schp.* — Fossés sur la route de La Chapelle.
- Climacium dendroides Web. et M.* — Prairies des bords du Loiret.
- Isothecium myurum Brid.*
- Thyridium tamariscinum B. E.*
- *abietinum B. E.*
- Hypnum lutescens Huds.*
- *albicans Neck.*
 - *rutabulum L.*
 - *velutinum L.*
 - *striatum Schreb.*
 - *piliferum Schreb.*
 - *prælongum L.*
 - *Stokesii Turn.*
 - *tenellum Dicks.*
 - *confertum Dicks.* — R. — Bois de l'Hermitage.
- *murale Hedw.* — RR.
 - *rusciforme Weis.* — Bords du Loiret; Chanteau.
 - *serpens L.*
 - *fluviatile Sw.* — Dans la Loire, à La Chapelle.
 - *riparium L.*
 - *intermedium Lindb.*
 - *cupressiforme L.*

Hypnum filicinum L. — R. — Bords de la Loire, à Saint-Marceaux.	Hypnum cuspidatum L.
— molluscum Hedw. — RR. — Forêt de Chanteau.	— Schreberi Wild.
— cordifolium Hedw. — Prairies du Loiret.	— purum L.
	— splendens Hedw.
	— squarrosum L.
	— triquetrum L.

CONTRIBUTION A LA FLORE BRYOLOGIQUE DU TONKIN (3^e Note);
par M. Émile BESCHERELLE (1).

Les Mousses envoyées dans ces dernières années au Muséum par le R. P. Bon, missionnaire au Tonkin, ont été récoltées comme les premières dans les provinces d'Ha-Noï et de Ninh-Binh. On y trouve la plupart des espèces qui ont fait l'objet de notre première Note, telles que : *Hymenostomum edentulum*, *Dicranella eustegia*, *Dasymitrium incurvum*, *Porotrichum alopecuroides*, *Pseudoleskea cryptocolea*, *P. tonkinensis*, *Thuidium Bonianum*, *Isopterygium macoense*, et *Ectropothecium chloroticum*; mais, en dehors de ces espèces qui paraissent assez abondantes dans la région, nous avons constaté la présence de dix nouvelles espèces et de cinq ou six autres qui se rencontrent dans des contrées voisines. Nous en donnons ci-après l'énumération.

***Hymenostomum edentulum* (Mitt., sub *Weisia*).**

Province de Ninh-Binh, Khang Thuong, sur les vieux murs, 10 février 1888 (H. Bon, n° 3629).

Province de Ha-Noï, monts Thinh Chau, Dong Ham, Dong Gion, Dong Bau, Seu, Lan Mat, Vo-Xa (H. Bon, n° 3800, 3853, 3885, 3887, 3889, 3895, 4101, 4751).

***Dicranella eustegia* Besch., Bull. Soc. bot., 1887.**

Province de Ha-Noï : mont Doi Ngang, 5 mars 1890 (H. Bon, n° 4290); Ninh Thai, mont Coi, 5 janvier 1888 (id. n° 3579 et 5 mars 1888, n° 3760).

La diagnose de cette Mousse (*l. c.*) doit être rétablie de la manière suivante : « Capsula in pedicello flavo erecta, inferne haud strumulosa... operculo subulato eam æquante recto vel obliquo. Peristomii, etc. »

(1) Cf. Bull. de la Soc. bot. de France, t. XXXIV, pp. 95-100; et Journal de Botanique, 1^{er} juin 1890.